

KRÄUTER

Art	Ein-jährig	Mehr-jährig	TKG [g] ca.	Saatgutbedarf [g/100 m ²] ca.	Reihen-/Pflanzen-abstand [cm]	Saatgutbedarf Topfkultur ca. [g/1000 Töpfe]	Aussaat I – XII (Jan-Dez)
Basilikum (<i>Ocimum basilicum</i> L.)	●		1,5–1,8	DS: 30 VK: 5–10	25–30/25	60	ganzjährig, LK, warm
Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i> L.)		●	0,1–0,2	DS: 30 VK: 2–3 g/1000 Pfl.	VK empfohlen 50/20	–	ab V LK
Bergbohnenkraut (<i>Satureja montana</i>)		●	0,8–1	DS: 60	50/40	10	ab V, LK
Bohnenkraut (<i>Satureja hortensis</i> L.)	●		0,5–0,8	DS: 80–100 VK: 2–5	25–30/25	10	IV–VI LK
Borretsch (<i>Borago officinalis</i> L.)	●		15–30	DS: 500, später vereinzeln	30/20–25	150	IV–VI
Brunnenkresse (<i>Nasturtium officinale</i>)		●	0,2–0,3	DS (FL): 5 DS (uG): 20–30	15/15	1,5–3	Mitte V – Mitte VIII
Dill (<i>Anethum graveolens</i> L.)	●		1–2	DS: 80–100	25–30	55	IV–VI
Estragon (<i>Artemisia dracunculus</i> L.)		●	0,2	DS: 30–50 VK: 2–5	50/50	5	III–IV LK
Fenchel, Gewürzfenchel (<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.)	●		4–6	DS: 40–60 VK: 10 g/1000 Pfl.	40/50	20	ab III
Kerbel (<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.)	●		2–2,5	DS: 30–50	10–15	45	III–VI, LK
Koriander (<i>Coriandrum sativum</i> L.)	●		3	DS: 50	25/15–25	80–100	IV
Lavendel (<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.)		●	1	DS: 20 VK: 2 g/1000 Pfl.	30/30	–	XII–III, LK
Liebstock (<i>Levisticum officinale</i> W.D.J. Koch)		●	2–5	DS: 50–80 VK: 20	50/40–50	50	uG ab III FL IV–V
Majoran (<i>Origanum majorana</i> L.)	●		0,2	DS: 100, VK: 2–5	30/15–20	5	ab Mitte V LK
Oregano/Dost (<i>Origanum vulgare</i> L.)		●	0,1	DS: 40, VK: 2	25/25	3	ab IV
Petersilienwurzel (<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A.W.Hill)		●	1,3–1,5	DS: 10–30			III–Anfang V
Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i> L.)		●	0,05	VK: 2, Aussaat im Herbst	30/30	2	III, LK, vorkühlen
Pimpinelle (<i>Sanguisorba minor</i> Scop.)		●	6–10	DS: 300 VK: 15 g/1000 Pfl.	25–30/20	80	ab IV
Portulak (<i>Portulaca oleracea</i> ssp. <i>sativa</i>)	●		0,4–0,6	DS: 30	20	–	ab Mitte V LK
Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i> L.)		●	0,7–1,3	VK: 20	40/30	30	uG ab II
Salattrauke (<i>Eruca sativa</i> Mill.)	●		2	DS: 100 Saattiefe 0,5 cm	15–20	40	FL III–IX uG ganzjährig
Salbei (<i>Salvia officinalis</i> L.)		●	5–7	DS: 120–150	30/40	100	V, LK
Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i> L.)		●	0,8–1	DS: 200, später vereinzeln	25/10	15–20	III–V LK
Schnittknoblauch (<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.)		●	3	DS: 500 VK: 5 g/1000 Pfl.	30	60	III–VIII
Schnittlauch (<i>Allium schoenoprasum</i> L.)		●	1–1,5	DS: 60–100 VK: 35–45 Korn/EPT	Reihenabstand: 30–40 bei Pflanzung: 25–30/25	–	VK uG: II od. VI–Anf. VIII FL: III–IV oder VIII
Schnittpetersilie (<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A.W.Hill)		●	1,2–1,8	VK: 3–5 Korn/EPT DS (FL): 40–100 DS (uG): 20	20–30	20	DS uG: VIII–IX
Thymian (<i>Thymus vulgaris</i> L.)		●	0,2–0,3	DS: 80, VK bei 15–18 °C	35–45/20–25	6	IV–VI LK
Wilde Rauke (<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.)	●		0,25	DS: 20–40 Saattiefe 1 cm	15–20/1,5	5	FL III–IX uG ganzjährig
Winterpostelein (<i>Claytonia perfoliata</i>)	●		0,5	DS: ca. 50	5–15	–	Mitte IX – III, Keimtemp. <12°C
Ysop (<i>Hyssopus officinalis</i> L.)		●	0,9–1,2	DS: 80 VK: 2 g/1000 Pfl.	50/30	20	ab Mitte V
Zitronmelisse (<i>Melissa officinalis</i> L.)		●	0,5–0,8	VK: 4 keimt langsam	30/40	6	III–IV LK

DS = Direktsaat VK = Vorkultur Pfl. = Pflanzen LK = Lichtkeimer uG = unter Glas FL = Freiland EPT = Erdpreßtopf

TKG = Tausendkorngewicht

Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung, Standort und Kulturführung von obiger Darstellung abweichen.